



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง กลุ่มงานบัญชี โทร. ๐ ๒๑๔๑ ๖๓๕๕

ที่ ลก๐๕๐ก.บ /ว ๖๗๖

วันที่ ๑๔

สิงหาคม ๒๕๖๙

เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสำหรับรักษาผู้ป่วยโรคกระดูกพรุนที่มีความเสี่ยงสูงมากต่อการเกิดกระดูกหัก

เรียน หัวหน้าหน่วยงานในสังกัดกรมการพัฒนารัฐบาล

กรมบัญชีกลาง แจ้งหลักเกณฑ์หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสำหรับรักษาผู้ป่วยโรคกระดูกพรุนที่มีความเสี่ยงสูงมากต่อการเกิดกระดูกหัก ทั้งนี้ ให้มีผลใช้บังคับสำหรับการรักษาพยาบาลที่เกิดขึ้นตั้งแต่วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๙ เป็นต้นไป รายละเอียดตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๑๖.๒/ว ๕๔๘ ลงวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๙ ที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และแจ้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องถือปฏิบัติต่อไป

(นางสาวเปรมจันทร์ รัตนสุวรรณศิริ)

ผู้อำนวยการกองคลัง



ที่ กค ๐๔๑๖.๒/ ๖๕๕๗



กรมบัญชีกลาง

ถนนพระรามที่ ๖ กทม. ๑๐๔๐๐

๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕

เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสำหรับรักษาผู้ป่วยโรคกระดูกพรุนที่มีความเสี่ยงสูงมากต่อการเกิดกระดูกหัก

เรียน ปลัดกระทรวง อธิบดี ผู้ว่าราชการจังหวัด เลขาธิการ ผู้อำนวยการ อธิการบดี ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ผู้อำนวยการสถานพยาบาลของทางราชการ

อ้างถึง ๑. หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๑๖.๒/ว ๓๔ ลงวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๑

๒. หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๑๖.๒/ว ๒๑ ลงวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๖

สิ่งที่ส่งมาด้วย แนวทางการกำกับการเบิกจ่ายค่ายา Teriparatide และ Romosozumab สำหรับผู้ป่วยโรคกระดูกพรุนที่มีความเสี่ยงสูงมากต่อการเกิดกระดูกหัก

ตามหนังสือที่อ้างถึง ๑ และ ๒ กรมบัญชีกลางกำหนดให้รายการยารักษาโรคกระดูกพรุนและโรคหัวใจและยาประเภทอื่น ๆ ที่มีค่าใช้จ่ายสูง ซึ่งเป็นทะเบียนยาใหม่ทุกประเภทที่ขึ้นทะเบียนกับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๑ เป็นต้นไป จะไม่สามารถเบิกจากทางราชการได้ จนกว่าจะมีการพิจารณาปรับเข้าระบบ Prior Authorization (PA) หรือกรอบรายการยาแล้วแต่กรณี ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

กรมบัญชีกลางพิจารณาแล้ว ขอเรียนว่า ปัจจุบันมียา Teriparatide ที่ใช้สำหรับรักษาผู้ป่วยโรคกระดูกพรุนที่มีความเสี่ยงสูงมากต่อการเกิดกระดูกหัก ซึ่งเป็นยานอกบัญชียาหลักแห่งชาติและยา Romosozumab ซึ่งขึ้นทะเบียนกับ อย. เมื่อวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๓ ดังนั้น เพื่อให้ผู้มีสิทธิและบุคคลในครอบครัวสามารถเข้าถึงยาที่จำเป็น มีประสิทธิภาพสอดคล้องกับแนวเวชปฏิบัติ ภายใต้การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลที่เป็นไปอย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับภาระงบประมาณ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๘ วรรคสอง ประกอบมาตรา ๑๙ แห่งพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล พ.ศ. ๒๕๕๓ และที่แก้ไขเพิ่มเติม อธิบดีกรมบัญชีกลางโดยได้รับมอบอำนาจจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง จึงเห็นสมควรดำเนินการ ดังนี้

๑. กำหนดหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยโรคกระดูกพรุนที่มีความเสี่ยงสูงมากต่อการเกิดกระดูกหัก และกำหนดอัตราการเบิกจ่ายค่ายา ดังนี้

๑.๑ ยา Teriparatide ในอัตราไม่เกิน ๗,๗๑๐ บาท ต่อ ๑ ค้ำม ต่อกล่อง

๑.๒ ยา Romosozumab ในอัตราไม่เกิน ๑๖,๖๗๐ บาท ต่อ ๒ ค้ำม ต่อกล่อง

ทั้งนี้ สำหรับการใช้จ่าย Teriparatide และ ยา Romosozumab ต้องเป็นไปตามแนวทางกำกับการเบิกจ่ายค่ายาที่กรมบัญชีกลางกำหนดรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย จึงจะสามารถเบิกจ่ายจากทางราชการได้


๒. กำหนดให้สถานพยาบาลเป็นผู้เบิกจ่ายค่ายาตามข้อ ๑.๑ - ๑.๒ ในระบบเบิกจ่ายตรงสวัสดิการรักษายาบาลข้าราชการเท่านั้น หากสถานพยาบาลมีการออกไปเสร็จรับเงินค่ายา ให้ระบุเป็น

“ค่ายาที่เบิกไม่ได้” ...

“ค่ายาที่เบิกไม่ได้” และไม่ให้ออกใบรับรองในการส่งจ่ายนอกบัญชียาหลักแห่งชาติ โดยผู้มีสิทธิจะไม่สามารถ
นำใบเสร็จรับเงินค่ายาดังกล่าวมายื่นเบิกเงินกับส่วนราชการต้นสังกัดได้
ทั้งนี้ ให้มีผลใช้บังคับสำหรับข้าราชการที่เกิขึ้นตั้งแต่วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๙ เป็นต้นไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และแจ้งให้ผู้มีสิทธิสวัสดิการรักษายาบาลข้าราชการ
และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทราบและถือปฏิบัติต่อไป ทั้งนี้ สามารถ Download สิ่งส่งมาด้วยได้จาก QR Code
ที่ปรากฏท้ายหนังสือฉบับนี้

ขอแสดงความนับถือ



(นางแพตริเซีย มงคลวนิช)

อธิบดีกรมบัญชีกลาง ปฏิบัติราชการแทน
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

กองสวัสดิการรักษายาบาล

กลุ่มงานนโยบายสวัสดิการรักษายาบาล

โทร. ๐ ๒๑๒๗ ๗๐๐๐ ต่อ ๖๘๕๐

โทรสาร ๐ ๒๑๒๗ ๗๑๕๗

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@cgd.go.th



แนวทางกำกับการเบิกจ่ายค่ายา Teriparatide และ Romosozumab
สำหรับผู้ป่วยโรคกระดูกพรุนที่มีความเสี่ยงสูงมากต่อการเกิดกระดูกหัก
(ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๑๖.๒/ว ๕๔๔ ลงวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๙)

๑. คุณสมบัติแพทย์ผู้ทำการรักษา

เป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญที่ได้รับหนังสืออนุมัติหรือวุฒิบัตรจากแพทยสภาในสาขาที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

- ๑.๑ สาขาสาขาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ (Orthopedics)
- ๑.๒ สาขาอายุรแพทย์โรคต่อมไร้ท่อและเมแทบอลิซึม (Endocrinologists)
- ๑.๓ สาขาอายุรแพทย์โรคข้อและรูมาติสซั่ม (Rheumatologists)
- ๑.๔ สาขาสตรีเวชวิทยา (Obstetrician-Gynecologist)

๒. เกณฑ์การอนุมัติการเบิกจ่ายค่ายา

อนุมัติให้ใช้กับผู้ป่วยโรคกระดูกพรุนที่มีความเสี่ยงสูงมากต่อการเกิดกระดูกหัก ข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้

- ๒.๑ กระดูกสันหลังหัก หรือกระดูกสะโพกหักจากโรคกระดูกพรุน ภายในระยะเวลา ๑๒ เดือน (recent fracture) ในผู้ป่วยที่มีอายุตั้งแต่ ๖๕ ปีขึ้นไป และมีค่า T-score น้อยกว่าหรือเท่ากับ -๒.๕
- ๒.๒ กระดูกสันหลังหักซ้ำ หรือมีกระดูกสันหลังหักตั้งแต่ ๒ ระดับขึ้นไป และมีความรุนแรงระดับปานกลาง (กระดูกยุบ ๒๕ - ๔๐%) ถึงรุนแรงมาก (กระดูกยุบมากกว่า ๔๐% ขึ้นไป) ทั้ง ๒ ระดับ
- ๒.๓ กระดูกสะโพกหัก ๒ ข้างจากโรคกระดูกพรุน หรือกระดูกสะโพกหักและกระดูกสันหลังหักจากโรคกระดูกพรุน หรือกระดูกหักจากโรคกระดูกพรุนซ้ำตั้งแต่ ๓ ครั้ง หรือ ๓ ตำแหน่งขึ้นไป
- ๒.๔ กระดูกหักจากโรคกระดูกพรุนเกิดขึ้นในระหว่างที่ได้รับยารักษาโรคกระดูกพรุนอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง (ยากลุ่ม Bisphosphonates หรือ Denosumab) เป็นระยะเวลาดังแต่ ๒ ปีขึ้นไป ร่วมกับไม่พบสาเหตุอื่นของโรคกระดูกพรุนชนิดทุติยภูมิ
- ๒.๕ ผู้ที่มี T-score ที่ตำแหน่งกระดูกสันหลังน้อยกว่าหรือเท่ากับ -๓.๕ หรือที่กระดูกสะโพกตำแหน่ง Total hip น้อยกว่าหรือเท่ากับ -๓.๐

๓. ขนาดยา และระยะเวลาของการรักษา

- ๓.๑ Teriparatide ขนาด ๒๐ ไมโครกรัม ฉีดเข้าชั้นไขมันใต้ผิวหนังวันละ ๑ ครั้ง ไม่เกิน ๒ ปี
- ๓.๒ Romosozumab ใช้ได้เฉพาะสตรีเท่านั้น ขนาด ๒๑๐ มิลลิกรัม ฉีดเข้าชั้นไขมันใต้ผิวหนังเดือนละ ๑ ครั้ง ไม่เกิน ๑ ปี

หมายเหตุ : การใช้ยาในข้อ ๓.๑ และ ๓.๒ ต้องให้ Calcium และ Vitamin D ร่วมด้วย

๔. เกณฑ์การห้ามใช้ยา

๔.๑ Teriparatide ข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้

- ๔.๑.๑ Paget's disease of bone
- ๔.๑.๒ ระดับ Alkaline phosphatase หรือ Parathyroid hormone สูงผิดปกติ
- ๔.๑.๓ ประวัติ Bone cancer หรือ bone metastasis
- ๔.๑.๔ Active or recent cancer ที่มีความเสี่ยงต่อการเกิด bone metastasis
- ๔.๑.๕ ประวัติการฉายแสงบริเวณกระดูก
- ๔.๑.๖ pre - existing hypercalcemia



๔.๒ Romosozumab ข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้

๔.๒.๑ มีกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน หรือ โรคหลอดเลือดสมอง (Stroke) ทั้ง Ischemic Stroke และ Hemorrhagic Stroke ภายใน ๑ ปี

๔.๒.๒ มีภาวะ Hypocalcemia ที่ยังไม่ได้รับการแก้ไข (pre - existing uncorrected hypocalcemia)

๕. เกณฑ์การหยุดยา

๕.๑ Teriparatide ข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้

๕.๑.๑ ขาดการรักษาเกิน ๓ เดือน

๕.๑.๒ เกิดอาการแพ้ยาอย่างรุนแรง

๕.๑.๓ มีการลดลงของมวลกระดูกอย่างมีนัยสำคัญ หลังการใช้ยาไปแล้ว ๑ ปี ยกเว้นในกลุ่มกระดูกพรุนที่เกิดจากการใช้ยากลุ่ม Glucocorticoids

๕.๑.๔ ใช้ยาครบ ๒ ปี

๕.๒ Romosozumab ข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้

๕.๒.๑ ขาดการรักษาเกิน ๓ เดือน

๕.๒.๒ มีกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน โรคหลอดเลือดสมอง (Stroke) ทั้ง Ischemic Stroke และ Hemorrhagic Stroke เกิดขึ้นระหว่างการใช้ยา

๕.๒.๓ เกิดอาการแพ้ยาอย่างรุนแรง

๕.๒.๔ ใช้ยาครบ ๑ ปี

๖. ข้อแนะนำ

๖.๑ ให้ติดตามความหนาแน่นมวลกระดูกด้วย DXA ที่ ๑ ปีหลังการรักษา

๖.๒ หลังใช้ยาครบระยะเวลาแล้ว ต้องให้การรักษาต่อด้วยยาในกลุ่ม Anti-resorptive drug เพื่อให้คงมวลกระดูกที่เพิ่มขึ้นหลังการรักษาไว้ได้ (Sequential Therapy)

๗. เงื่อนไขการเบิกจ่ายค่ายา Teriparatide และ Romosozumab

๗.๑ ไม่อนุมัติการเบิกจ่ายยา Teriparatide หากเคยได้รับการรักษาหรืออยู่ระหว่างการรักษาด้วยยา Romosozumab มาแล้ว

๗.๒ ไม่อนุมัติการเบิกจ่ายยา Romosozumab หากเคยได้รับการรักษาหรืออยู่ระหว่างการรักษาด้วยยา Teriparatide มาแล้ว

๗.๓ กรณีผู้ป่วยมารับการรักษาด้วยยา Teriparatide แพทย์สามารถสั่งจ่ายยาดังกล่าวให้ผู้ป่วยนำกลับบ้านได้ไม่เกิน ๒ ตำมหรือกล่อง ณ สถานพยาบาลที่เข้ารับการรักษายาประจำเท่านั้น

๗.๔ กรณีผู้ป่วยมารับการรักษาด้วยยา Romosozumab ผู้ป่วยต้องเข้ารับการฉีดยาดังกล่าว ณ สถานพยาบาลที่เข้ารับการรักษายาประจำเท่านั้น

